

TYP 2-DIABETES



Till dig som behandlas med
Forxiga® (dapagliflozin)

Det är viktigt att ha bra blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes

VID TYP 2-DIABETES ökar blodsockernivåerna i blodet.

Om blodsockernivåerna är höga under en längre tid kan det vara skadligt för kroppen.

Ett kontrollerat blodsocker minskar risken för komplikationer och skador på blodkärl, nerver, ögon och njurar.

Det här kan Forxiga® hjälpa dig med

DU HAR FÅTT FORXIGA® för att du har typ 2-diabetes och behöver hjälp att få ner blodsockret. Även om du behandlas med kost, motion och mediciner och gör ditt bästa, så stiger blodsockret ofta med tiden när man har typ 2-diabetes. Det är därför din läkare har skrivit ut Forxiga®.

LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN SOM FÖLJER MED FÖRPACKNINGEN innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Forxiga® – gör så att njurarna utsöndrar socker och sänker blodsockret


NJURARNA TAR NORMALT UPP SOCKER (glukos) och släpper ut det i blodet igen. Socker tas upp med hjälp av ett ämne som heter SGLT2*.

Forxiga® minskar överflödigt socker från kroppen genom att blockera SGLT2.

Det överflödiga sockret utsöndras då med urinen. Eftersom socker innehåller kalorier kan det leda till att man går ned i vikt.

Genom sin verkan i njuren kan Forxiga® komplettera många av de diabetesläkemedel som används idag.

Forxiga® hämmar SGLT2 så att ca 70 g socker per dag utsöndras i urinen och blodsockret sänks. Med hjälp av Forxiga® utsöndras socker istället för att återupptas.



När du tar Forxiga® regelbundet...

- får du hjälp att sänka ditt långtidsblodsocker (HbA_{1c}) till det blodsockermål som din läkare tycker är lämpligt för dig.
- Du kommer troligen att ta Forxiga® tillsammans med ett annat diabetesläkemedel.
- Forxiga® hjälper njurarna så att ca 70g socker utsöndras via urinen varje dag (motsvarar ca 23 sockerbitar och innehåller ca 280 kalorier).



Genom att röra på dig och äta en hälsosam kost kan du påverka ditt blodsocker i en positiv riktning. Fortsätt följa de livsstilsråd som du fått från din läkare eller sjuksköterska.

Forxiga® – en tablett om dagen

FORXIGA® GER EFFEKT UNDER 24 TIMMAR och bör endast tas en gång om dagen. Du kan ta tablettens med eller utan mat; svälj den hel med ett halvt glas vatten.

Forxiga® kan tas ensamt eller tillsammans med annan medicin som sänker blodsockret.

Tas när som helst under dagen, men gärna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Tas oberoende av måltider.



TIPS!

Pröva att ta Forxiga® vid frukost, middag eller när du borstar tänderna. Det hjälper dig att komma ihåg att ta Forxiga®.

A red circular arrow graphic, consisting of a thick red line forming a circle with an arrowhead pointing clockwise.

EN
TABLETT
DAGLIGEN

Om du glömmer ta en tablett eller tar för mycket Forxiga®

- Om det är 12 timmar eller mer tills du ska ta nästa dos, ta en dos Forxiga® så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.
- Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.
- Ta aldrig två doser samma dag eller vid samma tidpunkt.
- Om du har tagit för många tabletter av Forxiga®, ta omedelbart kontakt med läkare. Ta läkemedelsförpackningen med dig.



Möjliga biverkningar

FORXIGA® KAN SOM ALLA MEDICINER ge biverkningar, men det är inte alla som får dem.

- Risken för lågt blodsocker (hypoglykemi) är låg vid behandling med Forxiga® och metformin, men ibland ordinerar Forxiga® som ett tillägg till läkemedel som kan orsaka hypoglykemi (sulfonylurea eller insulin). Symtom på lågt blodsocker kan vara oro, skakningar, svettningar, snabba hjärtslag, hungerkänsla, huvudvärk, synförändringar, humörsvängningar och förvirringskänsla.
- Svampinfektioner i underlivet kan förekomma med symtom som klåda, irritation och rodnad på eller vid könsorgan (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).

Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av ovanstående symtom.

Sluta ta Forxiga® och uppsök en läkare så snart som möjligt om du märker någon av följande allvarliga biverkningar: Uttorkning på grund av för stor vätskeförlust* eller urinvägsinfektion. Om du ser blod i urinen berätta det omedelbart för din läkare.

* Tecken på uttorkning är en mycket torr eller klibbig mun, stark törst, mycket sömning eller trött, lite eller ingen urin och snabba hjärtslag.

Mina anteckningar

Forxiga® (dapagliflozin) filmdragerade tabletter, SGLT2-hämmare.

Indikationer: Forxiga är avsett för vuxna från 18 år med diabetes mellitus typ 2 för att förbättra glykemisk kontroll. Forxiga finns som tabletter i styrkan 10 mg. **Läs alltid bipacksedeln noggrant.**

