

Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska

# **INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE<sup>®</sup> (empagliflozin)**

**Patientinformation för dig som behandlas  
med JARDIANCE mot typ 2-diabetes**

**Jardiance<sup>®</sup>**   
(empagliflozin)

## Ett steg i rätt riktning

JARDIANCE kan ha en positiv inverkan på din hälsa både på kort och lång sikt genom att:

- hjälpa dig att **kontrollera ditt blodsocker**
- **skydda ditt hjärta och dina blodkärl** om du lider av hjärt- och kärlsjukdom.




**Typ 2-diabetes ger en  
2 TILL 4 GÅNGER ÖKAD RISK  
att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.**

## Typ 2-diabetes är skadligt för hjärta och kärl

Ett förhöjt blodsocker vid typ 2-diabetes kan leda till:

**Problem i små blodkärl,** vilket kan skada synen, nerver och njurar.



**Problem i hjärta och stora blodkärl,** till exempel hjärtinfarkt och stroke.

**Om du har hjärt- och kärlsjukdom kan JARDIANCE hjälpa dig minska risken för dödliga hjärt- och kärlhändelser, tex hjärtinfarkt och stroke.**

# Så fungerar JARDIANCE

Typ 2-diabetes leder till en ohälsosam upplagring av socker i kroppen. Detta sker bland annat med hjälp av en substans i njurarna som heter SGLT2.

Genom att blockera SGLT2 medverkar JARDIANCE till att överflödigt socker (cirka 78 g, per dag vilket motsvarar 312 kilokalorier) försvinner ut ur kroppen via urinen.



Utan behandling

Med JARDIANCE

## Detta gör JARDIANCE för dig



JARDIANCE hjälper dig att hålla HbA<sub>1c</sub> på rätt nivå.



JARDIANCE kan ge en viss viktnedgång, men är inte ett läkemedel avsett för viktminskning.\*



Om du har hjärt- och kärlsjukdom kan JARDIANCE minska risken för nya hjärt- och kärlhändelser, t ex hjärtinfarkt, stroke samt dödsfall.

---

\* JARDIANCE kommer varje dag att hjälpa din kropp att göra sig av med överflödigt socker. Det betyder dock inte att du kontinuerligt kommer att gå ner i vikt.

---

# Möjliga biverkningar med JARDIANCE

Alla läkemedel kan ge biverkningar, men alla behöver inte få dem. Prata alltid med din läkare om du upplever någon biverkan. De vanligaste biverkningarna är listade här. I bipacksedeln kan du läsa mer om biverkningar.

## **Svampinfektion i underlivet**

- Kan ge symtom som rodnad, klåda och irritation i underlivet.
- Är vanligare hos kvinnor.

## **Urinvägsinfektion**

- Kan ge en brännande känsla när man kissar, grumlig och ibland blodblandad urin och behov av täta toalettbesök. Smärta i bäckenet och/eller ryggen förekommer också.
- Drabbar oftare kvinnor.

## Ökat behov av att kissa

- Eftersom JARDIANCE för ut överflödigt socker med urinen, upplever en del personer att de behöver kissa oftare än normalt (i genomsnitt ett extra toalettbesök per dag).

**Även om du upplever biverkningar av JARDIANCE ska du inte sluta ta din medicin innan du har talat med din läkare. Han/hon kommer att ge dig besked om hur du ska göra.**



## JARDIANCE i kombination med andra läkemedel mot typ 2-diabetes

En del av de mediciner som används vid diabetes kan ibland göra att blodsockret sjunker för mycket (hypoglykemi). JARDIANCE bidrar i sig själv sällan till att blodsockernivåerna blir för låga. Om du däremot tar JARDIANCE i kombination med andra läkemedel mot diabetes (sulfonureider eller insulin) ökar risken för hypoglykemi.

**Prata alltid med din läkare om vilka andra mediciner du tar mot din diabetes och eventuella andra sjukdomar.**





## Gör JARDIANCE till en del av din vardag



**Ta en tablett om dagen ...**



**... vid en tidpunkt som passar dig ...**



**... med eller utan mat.**

Ta alltid JARDIANCE som din läkare ordinerat, även då du känner dig bra. Hoppas du över en tablett kan ditt blodsocker stiga igen. Om du råkar glömma en dos, ta nästa så snart du kommer ihåg det. Om du inte kommer ihåg det förrän det är dags för nästa dos, ska du dock inte ta två tabletter, utan bara en precis som vanligt.

**TIPS:** För att lättare komma ihåg tabletten, ta den vid samma tillfälle varje dag, tex vid frukosten eller i samband med att du borstar tänderna.

## Frågor och svar

### **Innebär min typ 2-diabetes att jag lättare drabbas av hjärt- och kärlsjukdom?**

Typ 2-diabetes ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Följaktligen är hjärt- och kärlsjukdom mycket vanligt hos personer som har typ 2-diabetes. Prata med din läkare så får du veta mer.

### **Varför behöver jag JARDIANCE när jag redan tar läkemedel som hjälper mig att minska risken för nya hjärt- och kärlländelser?**

Förutom att hålla HbA<sub>1c</sub> på rätt nivå kan JARDIANCE ytterligare minska risken för hjärt- och kärlländelser, utöver de hjärt- och kärlläkemedel du redan tar. Du ska inte avbryta din nuvarande medicinering utan att först prata med din läkare.

### **Kan jag ta JARDIANCE tillsammans med andra diabetesmediciner?**

JARDIANCE används vanligtvis i kombination med andra diabetesmediciner, inklusive insulin.

## Kom ihåg!

- Prata alltid med din läkare om vilka andra mediciner du tar mot din diabetes och eventuella andra sjukdomar.
- Om du upplever biverkningar av JARDIANCE ska du inte sluta ta din medicin utan att först prata med din läkare. Han/hon kommer att ge dig besked om hur du ska göra.
- Kontakta genast läkare om du får biverkningar av din medicin.



JARDIANCE (empagliflozin), 10 mg och 25 mg filmdragerade tabletter. Din läkare har ordinerat detta läkemedel för att kunna sänka ditt blodsocker. Jardiance används för att behandla typ 2-diabetes hos vuxna patienter (18 år eller äldre). Jardiance används om din diabetes inte kan kontrolleras med kost och motion och andra diabetesläkemedel. Jardiance kan användas ensamt om man inte tolererar metformin, eller tillsammans med andra läkemedel för behandling av diabetes. Det är viktigt att du fortsätter med de kost- och motionsprogram som rekommenderats av din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Använd inte Jardiance om du är allergisk mot empagliflozin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Tala med din läkare innan du börjar ta Jardiance om du har något av dessa symtom: typ 1-diabetes; förhöjda nivåer av "ketonkroppar" i urin eller blod; allvarliga njurproblem; mycket höga nivåer av glukos i blodet; är 75 år eller äldre; du känner dig sjuk eller har feber eller inte kan äta eller dricka; du har en allvarlig infektion i njurarna eller urinvägarna tillsammans med feber. Är du 85 år eller äldre bör du inte börja ta Jardiance. Läs alltid bipacksedeln. Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, 117 49 Stockholm. Tel 08-721 21 00. Denna information grundar sig på produktresumé 02/2017.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

**Jardiance**<sup>®</sup>   
(empagliflozin)



Boehringer Ingelheim AB Liljeholmsstranden 3  
Box 47608 117 49 Stockholm Tel 08-721 21 00